

## ГРИПП ПТИЦ, ОРНИТОЗ, САЛЬМОНЕЛЛЕЗ

**Грипп птиц** – заразное заболевание, вызываемое вирусом.

Благодаря высокой способности к изменению вируса, гриппом птиц болеют домашняя и дикая птица. К птичьему гриппу восприимчивы отдельные виды животных и человек.

**Орнитоз (пситтакоз)** – заразное заболевание, вызываемое хламидией.

К орнитозу восприимчивы многие декоративные птицы, особенно семейство попугаевых, канарейки, голуби и сельскохозяйственная птица – куры, утки, гуси, индейки, фазаны (более 140 видов). К пситтакозу восприимчив человек.

**Сальмонеллез птиц** – заразное заболевание, вызываемое бактерией.

Поражает все виды птиц, наиболее тяжело заболевание протекает у водоплавающих птиц, голубей, попугаев, канареек. К сальмонеллезу восприимчив человек.



### Источник заражения человека:

При всех заболеваниях источником заражения служит больная птица и продукты ее жизнедеятельности, но при гриппе птиц и сальмонеллезе кроме того источником заражения могут стать мясо и яйца птиц без соответствующей термической обработки.



### Симптомы заболевания:

**Грипп птиц** – у больной птицы наблюдается угнетенное состояние, отсутствие реакции на окружающих, необычное поведение, нарушение в координации движений. Отмечается затрудненное дыхание, кашель, чихание, истечения из носа, опухание и посинение гребня и сережек у кур.

**Орнитоз (пситтакоз)** – у попугаев и др. декоративных птиц (после инкубационного периода от 7 до 40 сут.) признаки заливости, потере аппетита, полости. При продолжительности (параличи ног и



заболевания выражаются в вялости, сонливости, одышке и воспалении носовой полости. У домашних птиц орнитоз протекает чаще в скрытой форме, и они, как правило, при своевременном лечении, выздоравливают. Иммунитет, как правило, нестойкий, заболевание может повториться.

**Сальмонеллез** – после короткого инкубационного периода (3–4 дня) у больной птицы развивается вялость, угнетение, повышение температуры, расстройство кишечника. Часто при острой инфекции возника-